



PRÉPASIMPLE

prepasimple.fr

EDHEC

Mathématiques — Option économique

2015

Mathématiques appliquées

Mathématiques appliquées — Prépa ECG

Annales de concours · Sujet

Exercice 1

On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3, e_4, e_5)$ la base canonique de $\mathbb{R}^5$. On désigne par I la matrice identité de $\mathcal{M}_5(\mathbb{R})$ et on considère l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^5$ dont la matrice dans la base $\mathcal{B}$ est :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- 1) a) Déterminer la dimension de $\text{Im}(f)$, puis montrer que la famille $(e_2 + e_3 + e_4, e_1 + e_5)$ est une base de $\text{Im}(f)$.
- 1) b) En déduire la dimension de $\text{Ker}(f)$ puis donner une base de $\text{Ker}(f)$.
- 2) On note $u = e_2 + e_3 + e_4$ et $v = e_1 + e_5$.
- 2) a) Écrire $f(u)$ et $f(v)$ comme combinaisons linéaires de e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 , puis $f(u - v)$ et $f(u + 3v)$ comme combinaisons linéaires de u et v .
- 2) b) En déduire les valeurs propres de f et préciser les sous-espaces propres associés.
- 2) c) Établir que C est diagonalisable et déterminer une matrice D diagonale et une matrice R inversible telles que $C = RDR^{-1}$.
- 3) a) Établir la relation suivante : $D(D + I)(D - 3I) = 0$.

3) b) En déduire que le polynôme P défini par $P(X) = X^3 - 2X^2 - 3X$ est un polynôme annulateur de C .

4) On admet que, pour tout entier naturel n non nul, il existe un unique polynôme Q_n et trois réels a_n, b_n, c_n tels que :

$$X^n = (X^3 - 2X^2 - 3X)Q_n(X) + a_nX^2 + b_nX + c_n.$$

4) a) En utilisant les racines de P , déterminer les valeurs de a_n, b_n, c_n en fonction de n .

4) b) Déduire de ce qui précède l'expression, pour tout entier naturel n non nul, de C^n en fonction de C et C^2 .

5) Compléter, à l'aide de matrices de type `np.zeros` et `np.ones`, les deux espaces laissés libres dans la commande Python suivante pour qu'elle permette de construire la matrice C .

La commande `np.ones((r, s))` construit un tableau de r lignes et s colonnes rempli de 1 ; `np.zeros((r, s))` construit le tableau de mêmes dimensions rempli de 0. La commande `np.block([[A, B], [D, E]])` assemble les blocs d'une même liste horizontalement, puis les listes verticalement, lorsque leurs dimensions le permettent. Une ligne de blocs peut contenir un seul bloc.

Python

```
import numpy as np

C = np.block([[np.ones((1, 5))],
              [..., ...],
              [np.ones((1, 5))]])
```

Exercice 2

Trois personnes, notées A , B et C , entrent simultanément dans une agence bancaire disposant de deux guichets. Les clients A et B occupent simultanément à l'instant 0 les deux guichets tandis que C attend qu'un de ces deux guichets se libère pour se faire servir.

On suppose que :

- Les durées de passage au guichet des trois personnes A , B et C sont mesurées en heures et sont des variables aléatoires indépendantes, notées respectivement X , Y et Z , suivant toutes la loi uniforme sur $[0, 1[$.
- La durée du changement de personne à un guichet est négligeable.

1) On pose $U = \min(X, Y)$ et $V = \max(X, Y)$ et on admet que U et V sont des variables aléatoires.

1) a) Montrer que la fonction de répartition F_U de U est définie par :

$$F_U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ 2x - x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

1) b) En déduire que U est une variable aléatoire à densité et donner une densité f_U de U .

1) c) Déterminer l'espérance et la variance de U .

2) On note T le temps total passé par C dans l'agence bancaire.

2) a) Exprimer T en fonction de certaines des variables précédentes.

2) b) En déduire $E(T)$ et $V(T)$.

3) a) Pour deux tableaux NumPy a et b de même longueur n , les commandes `np.minimum(a, b)` et `np.maximum(a, b)` renvoient les tableaux de leurs minima et maxima calculés coordonnée par coordonnée. La commande `rd.random(n)` simule n variables indépendantes de loi uniforme sur $[0, 1[$. Les appels distincts réalisent ici des simulations indépendantes.

Compléter les commandes Python suivantes pour qu'elles permettent de simuler n fois les variables aléatoires U , V et T , pour n entré par l'utilisateur, entier strictement positif :

Python

```
import numpy as np

import numpy.random as rd

n = int(input("Entrez la valeur de n : "))

x = rd.random(n)

y = rd.random(n)

z = rd.random(n)

u = ...

print("u =", u)

v = ...

print("v =", v)

t = ...

print("t =", t)
```

3) b) Que représente l'événement $[T \geq V]$?

3) c) On souhaite déterminer une valeur approchée de la probabilité $p = P(T \geq V)$ en simulant un grand nombre de fois le passage des clients A , B et C aux guichets.

Pour un tableau booléen, `np.mean` calcule la proportion de valeurs True, en comptant True pour 1 et False pour 0. Compléter les commandes suivantes pour que, placées

sous les commandes écrites à la question 3) a), elles permettent d'obtenir une valeur approchée de p :

Python

```
p = ...  
print("p =", p)
```

- 3) d) Lors de plusieurs essais des commandes ci-dessus, avec $n = 10000$, la réponse donnée par le programme est comprise entre 0,66 et 0,67. Que peut-on conjecturer quant à la valeur exacte de p ?

Exercice 3

- 1) Pour tout entier naturel k , on pose :

$$I_k = \int_0^{+\infty} t^k e^{-t} dt.$$

- 1) a) Justifier que I_0 , I_1 et I_2 sont des intégrales convergentes et donner leur valeur ; on pourra s'appuyer sur le cours de probabilité.

- 1) b) Pour tout réel a positif et tout entier naturel k , on pose $I_k(a) = \int_0^a t^k e^{-t} dt$.

Établir, grâce à une intégration par parties :

$$I_{k+1}(a) = (k+1)I_k(a) - a^{k+1}e^{-a}.$$

- 1) c) En déduire que I_3 et I_4 sont des intégrales convergentes et vérifier que $I_3 = 6$ et $I_4 = 24$.

- 2) Dédurre des questions précédentes que, pour tout couple (x, y) de réels,

$$\int_0^{+\infty} (y + xt + t^2)^2 e^{-t} dt \text{ est une intégrale convergente.}$$

On considère, pour toute la suite, la fonction f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = \int_0^{+\infty} (y + xt + t^2)^2 e^{-t} dt.$$

Le domaine $\mathbb{R}^2$ est un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

3) a) Vérifier que l'on a : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 12x + 4y + 2xy + 24$.

3) b) Justifier que f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.

4) a) Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f puis déterminer le seul point critique (a, b) de f .

4) b) Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de f et écrire la matrice hessienne $\nabla^2 f(a, b)$ de f en son point critique.

4) c) Déterminer les valeurs propres de $\nabla^2 f(a, b)$ et en déduire que f admet un extremum local m au point (a, b) dont on précisera la nature (minimum ou maximum) et la valeur.

5) Le but de cette question est de montrer qu'en fait cet extremum est global.

5) a) Compléter le membre de droite de l'égalité suivante :

$$2x^2 + 2xy + 12x = 2 \left(x + \frac{y}{2} + 3 \right)^2 - \dots$$

5) b) Compléter de même l'égalité :

$$\frac{y^2}{2} - 2y + 6 = \frac{1}{2}(y - 2)^2 + \dots$$

5) c) En déduire une autre écriture de $f(x, y)$ montrant que l'extremum trouvé plus haut est global.

Problème

Partie 1

Dans cette partie, x désigne un réel de $[0, 1[$.

1) a) Montrer que :

$$\forall m \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq \int_0^x \frac{t^m}{1-t^2} dt \leq \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{m+1}.$$

1) b) En déduire que $\lim_{m \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{t^m}{1-t^2} dt = 0$.

2) a) Pour tout réel t de $[0, 1[$ et pour tout k élément de $\mathbb{N}^*$, calculer

$$\sum_{j=0}^{k-1} t^{2j}.$$

2) b) En déduire :

$$\sum_{j=0}^{k-1} \frac{x^{2j+1}}{2j+1} = \int_0^x \frac{1}{1-t^2} dt - \int_0^x \frac{t^{2k}}{1-t^2} dt.$$

2) c) Utiliser la question 1) pour montrer que la série de terme général $\frac{x^{2j+1}}{2j+1}$ converge et exprimer

$$\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{x^{2j+1}}{2j+1}$$

sous forme d'une intégrale que l'on ne cherchera pas à calculer.

2) d) Conclure que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \sum_{j=k}^{+\infty} \frac{x^{2j+1}}{2j+1} = \int_0^x \frac{t^{2k}}{1-t^2} dt.$$

On admet sans démonstration que l'on a aussi :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \sum_{j=k+1}^{+\infty} \frac{x^{2j}}{2j} = \int_0^x \frac{t^{2k+1}}{1-t^2} dt.$$

Partie 2

Un joueur réalise une suite de lancers indépendants d'une pièce. Cette pièce donne « pile » avec la probabilité p , où $0 < p < 1$, et « face » avec la probabilité $q = 1 - p$.

On note N la variable aléatoire égale au rang d'apparition du premier « pile ».

Si N prend la valeur n , le joueur place n boules numérotées de 1 à n dans une urne, puis il extrait une boule au hasard de cette urne. On dit que ce joueur a gagné si le numéro porté par la boule tirée est impair et on désigne par A l'événement « le joueur a gagné ».

On appelle X la variable aléatoire égale au numéro porté par la boule tirée de l'urne.

1) Reconnaître la loi de N .

2) a) Montrer que, si m est un entier naturel, la commande `2 * np.floor(m / 2)` renvoie la valeur m si et seulement si m est pair. La commande `np.floor` renvoie la partie entière inférieure de son argument.

2) b) Compléter les commandes Python suivantes pour qu'elles simulent N et X puis renvoient l'un des deux messages : « le joueur a gagné » ou « le joueur a perdu ».

La commande `rd.geometric(p)` simule une loi géométrique de paramètre p sur $\mathbb{N}^*$. La commande `rd.randint(a, b)` simule une loi uniforme discrète sur les entiers de a

inclus à b exclu. Le tirage dans l'urne est effectué conditionnellement au nombre de boules obtenu.

Python

```
import numpy as np

import numpy.random as rd

p = float(input("Donner la valeur de p : "))
N = rd.geometric(...)
X = rd.randint(..., ...)

if ...:
    print("...")
else:
    print("...")
```

- 3) a) Donner, pour tout entier naturel k supérieur ou égal à j , la valeur de $P_{[N=2j]}(X = 2k + 1)$, pour $j \geq 1$.
- 3) b) Donner, pour tout entier naturel k supérieur ou égal à $j + 1$, la valeur de $P_{[N=2j+1]}(X = 2k + 1)$, pour $j \geq 0$.
- 3) c) Déterminer $P_{[N=2j]}(X = 2k + 1)$ lorsque k appartient à $\llbracket 0, j - 1 \rrbracket$, pour $j \geq 1$.
- 3) d) Déterminer $P_{[N=2j+1]}(X = 2k + 1)$ lorsque k appartient à $\llbracket 0, j \rrbracket$, pour $j \geq 0$.
- 4) a) Justifier que :

$$P(X = 2k + 1) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(N = n)P_{[N=n]}(X = 2k + 1).$$

En admettant que l'on peut scinder la somme précédente selon la parité de n , montrer

que :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X = 2k + 1) = \frac{p}{q} \left(\sum_{j=k+1}^{+\infty} \frac{q^{2j}}{2j} + \sum_{j=k}^{+\infty} \frac{q^{2j+1}}{2j+1} \right).$$

4) b) En déduire :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad P(X = 2k + 1) = \frac{p}{q} \int_0^q \frac{t^{2k}}{1-t} dt.$$

5) a) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^q \frac{t^{2n+2}}{(1-t)^2(1+t)} dt = 0$.

5) b) Montrer que :

$$\sum_{k=0}^n P(X = 2k + 1) = \frac{p}{q} \left(\int_0^q \frac{1}{(1-t)^2(1+t)} dt - \int_0^q \frac{t^{2n+2}}{(1-t)^2(1+t)} dt \right).$$

5) c) En déduire :

$$P(A) = \frac{p}{q} \int_0^q \frac{1}{(1-t)^2(1+t)} dt.$$

6) a) Trouver trois constantes réelles a, b, c telles que, pour tout t différent de 1 et de -1 , on ait :

$$\frac{1}{(1-t)^2(1+t)} = \frac{a}{1-t} + \frac{b}{1+t} + \frac{c}{(1-t)^2}.$$

6) b) Écrire $P(A)$ explicitement en fonction de q .

6) c) En déduire que $P(A) > \frac{1}{2}$.