



PRÉPASIMPLE

prepasimple.fr

EDHEC

Mathématiques — Option économique

2019

Mathématiques appliquées

Mathématiques appliquées — Prépa ECG

Annales de concours · Sujet

Exercice 1

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont A est la matrice relativement à la base canonique $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ de $\mathbb{R}^3$ et Id l'endomorphisme identité de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice est I .

- 1) a) Déterminer $(A - I)^2$.
- 1) b) En déduire que A est inversible et écrire A^{-1} comme combinaison linéaire de I et A .
- 2) On pose $A = N + I$.
- 2) a) Exprimer, pour tout entier naturel n , la matrice A^n comme combinaison linéaire de I et N , puis l'écrire comme combinaison linéaire de I et A .
- 2) b) Vérifier que l'expression précédente est aussi valable pour $n = -1$.
- 3) a) Utiliser la première question pour déterminer la seule valeur propre de A .
- 3) b) En déduire si A est ou n'est pas diagonalisable.
- 4) On pose $u_1 = (f - Id)(e_1)$ et $u_2 = e_1 + e_3$.
- 4) a) Montrer que le rang de $f - Id$ est égal à 1.
- 4) b) Justifier que (u_1, u_2) est une base de $\text{Ker}(f - Id)$.

5) a) Montrer que la famille (u_1, u_2, e_1) est une base de $\mathbb{R}^3$.

5) b) Déterminer la matrice T de f dans cette même base.

6) Soit la matrice $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Justifier l'inversibilité de P puis écrire la relation

existant entre les matrices A , T , P et P^{-1} .

7) On note $(E_{1,1}, E_{1,2}, E_{1,3}, E_{2,1}, E_{2,2}, E_{2,3}, E_{3,1}, E_{3,2}, E_{3,3})$ la base canonique de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ et on rappelle que, pour tout $(i, j) \in \{1, 2, 3\}^2$, la matrice $E_{i,j}$ n'a que des coefficients nuls sauf celui situé à l'intersection de la i -ième ligne et de la j -ième colonne qui vaut 1.

7) a) Montrer que l'ensemble E des matrices M qui commutent avec T , c'est-à-dire des matrices vérifiant l'égalité $MT = TM$, est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ engendré par la famille $(E_{1,1} + E_{3,3}, E_{1,2}, E_{1,3}, E_{2,2}, E_{2,3})$. Vérifier que la dimension de E est égale à 5.

7) b) Soit N une matrice quelconque de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Établir l'équivalence :

$$NA = AN \iff (P^{-1}NP)T = T(P^{-1}NP).$$

7) c) En déduire que l'ensemble F des matrices qui commutent avec A est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ engendré par la famille

$$(P(E_{1,1} + E_{3,3})P^{-1}, PE_{1,2}P^{-1}, PE_{1,3}P^{-1}, PE_{2,2}P^{-1}, PE_{2,3}P^{-1}).$$

Exercice 2

Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3.

Une urne contient une boule noire non numérotée et $n - 1$ boules blanches dont $n - 2$ portent le numéro 0 et une porte le numéro 1. On extrait ces boules au hasard, une à une, sans remise, jusqu'à l'apparition de la boule noire.

Pour chaque $i \in \{1, \dots, n - 1\}$, on note B_i l'événement : «le i -ième tirage donne une boule blanche», on pose $N_i = \overline{B_i}$ et on note X la variable aléatoire égale au rang d'apparition de la boule noire.

1) Donner l'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs que peut prendre la variable X .

2) a) Pour tout $i \in \{2, \dots, n - 1\}$, justifier que

$$P(B_i \mid B_1 \cap \dots \cap B_{i-1}) = \frac{n - i}{n - i + 1}.$$

2) b) Utiliser la formule des probabilités composées pour trouver $P(X = k)$, pour tout $k \in X(\Omega)$.

2) c) Reconnaître la loi de X et donner son espérance et sa variance.

3) On note Y la variable aléatoire qui vaut 1 si la boule numérotée 1 a été piochée lors de l'expérience précédente, et qui vaut 0 sinon.

3) a) Pour tout $k \in X(\Omega)$, montrer, toujours grâce à la formule des probabilités composées, que

$$P([X = k] \cap [Y = 0]) = \frac{n - k}{n(n - 1)}.$$

3) b) En déduire $P(Y = 0)$.

3) c) Reconnaître la loi de Y et donner son espérance et sa variance.

4) Simulation informatique.

La commande `rd.randint(a, b)` renvoie un entier uniforme parmi les entiers de a inclus à b exclu. La commande `int(input(message))` lit un entier saisi par l'utilisateur ; `print` affiche ses arguments.

4) a) Compléter le script Python suivant afin qu'il simule l'expérience aléatoire décrite dans cet exercice et affiche la valeur prise par la variable aléatoire X .

On admettra que la boule noire est codée tout au long de ce script par le nombre $nB + 1$, où nB désigne le nombre de boules blanches.

Python

```
import numpy.random as rd

n = int(input("Entrez une valeur pour n : "))
nB = n - 1
X = 1
u = rd.randint(1, nB + 2)
while u < nB + 1:
    nB = ...
    u = rd.randint(1, ...)
    X = ...
print("La boule noire est apparue au tirage numéro", X)
```

4) b) Compléter les instructions repérées (4) et (8) ajoutées au script précédent, ainsi que les blancs déjà présents, afin que le script qui suit renvoie et affiche, en plus de celle prise par X , la valeur prise par Y .

Python

```
import numpy.random as rd

n = int(input("Entrez une valeur pour n : "))
nB = n - 1
X = 1
```

```
Y = ... # (4)
u = rd.randint(1, nB + 2)
while u < nB + 1:
    nB = ...
    if u == 1:
        Y = ... # (8)
    u = rd.randint(1, ...)
X = ...

print("La boule noire est apparue au tirage numéro", X)
print("La valeur de Y est", Y)
```

Exercice 3

Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = \int_0^1 (1 - t^2)^n dt$. On a donc, en particulier, $u_0 = 1$.

1) Déterminer u_1 et u_2 .

2) a) Montrer que la suite (u_n) est décroissante.

2) b) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

3) On se propose dans cette question de déterminer la limite de la suite (u_n) .

3) a) Rappeler la valeur de l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/(2\sigma^2)} dt$, pour $\sigma > 0$.

3) b) En déduire, pour $n \geq 1$, la valeur de l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-nt^2} dt$ puis celle de $\int_0^{+\infty} e^{-nt^2} dt$.

3) c) Montrer que, pour tout réel t , on a $e^{-t^2} \geq 1 - t^2$.

3) d) En déduire que, pour tout $n \geq 1$, $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$, puis donner la limite de la suite (u_n) .

4) Calculer $\int_0^1 (1-t)^n dt$ puis montrer que $u_n \geq \frac{1}{n+1}$. Que peut-on en déduire en ce qui concerne la série de terme général u_n ? Pour cette dernière conclusion, on pourra comparer les sommes partielles à $\int_1^{m+2} \frac{dt}{t}$.

5) a) Établir, grâce à une intégration par parties, que, pour tout entier naturel n , on a

$$u_{n+1} = (2n+2)(u_n - u_{n+1}).$$

5) b) En déduire l'égalité

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{4^n (n!)^2}{(2n+1)!}.$$

5) c) Montrer que $u_n \sim \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{n}}$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Indications : pour $\delta \in]0, 1[$ fixé, établir que $\ln(1-t^2) \geq -\frac{t^2}{1-\delta^2}$ pour $0 \leq t \leq \delta$, en

écrivant $\ln(1-t^2) = -\int_0^{t^2} \frac{dv}{1-v}$. Minorer alors u_n par une intégrale sur $[0, \delta]$, puis

utiliser le changement de variable affine $s = t \sqrt{\frac{n}{1-\delta^2}}$. Conclure à l'aide de la question 3) d) et de l'intégrale gaussienne calculée en 3) b), en choisissant δ aussi petit que nécessaire.

6) Informatique.

La fonction `produit(t)` ci-dessous renvoie le produit des éléments d'une liste `t`, avec la convention qu'un produit vide vaut 1. La commande `list(range(1, n + 1))` crée la liste des entiers de 1 à n ; cette liste est vide si $n = 0$. La commande `int(input(message))` lit un entier et `print` affiche un résultat.

Compléter le script Python suivant afin qu'il permette de calculer et d'afficher la valeur de u_n pour une valeur de n entrée par l'utilisateur.

Python

```
def produit(t):
    p = 1
    for a in t:
        p = p * a
    return p

n = int(input("Entrez une valeur pour n : "))
x = list(range(1, n + 1))
m = 2 * n + 1
y = list(range(1, m + 1))
v = ...
w = ...
u = ... * v**2 / w
print(u)
```

Problème

Partie 1 : étude de quelques propriétés d'une variable aléatoire X

Dans ce problème, θ désigne un réel élément de $]0, \frac{1}{2}[$. On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta x^{1+1/\theta}} & \text{si } x \geq 1, \\ 0 & \text{si } x < 1. \end{cases}$$

1) Montrer que f peut être considérée comme une densité.

On considère dans la suite une variable aléatoire X de densité f et on note F sa fonction

de répartition.

- 2) Montrer que X possède une espérance et une variance et les déterminer.
- 3) Déterminer, pour tout réel x , l'expression de $F(x)$ en fonction de x et θ .
- 4) a) Montrer que l'équation $F(x) = \frac{1}{2}$ possède une seule solution, notée M_e , que l'on déterminera.
- 4) b) Montrer que $\forall x \in [0, \frac{1}{2}], \quad 2^x(1-x) \leq 1$.
- 4) c) Comparer $E(X)$ et M_e .
- 5) Soit a un réel supérieur ou égal à 1 et b un réel strictement positif.
- 5) a) Montrer que $P(X > a+b \mid X > a) = \left(\frac{a}{a+b}\right)^{1/\theta}$.
- 5) b) Déterminer la limite de cette quantité lorsque a tend vers $+\infty$. Interpréter cette dernière valeur si l'on admet que la variable X représente la durée de vie d'un certain appareil.

Partie 2 : simulation de X

- 6) On pose $Y = \ln X$ et on admet que Y est une variable aléatoire définie sur le même espace probabilisé que X . On note G sa fonction de répartition.
- 6) a) Pour tout réel x , exprimer $G(x)$ à l'aide de la fonction F .
- 6) b) En déduire que Y suit une loi exponentielle dont on précisera le paramètre.

- 7) La commande `rd.exponential(scale)` simule une variable aléatoire suivant la loi exponentielle d'espérance `scale`, donc de paramètre $1 / \text{scale}$. La commande `np.exp(y)` calcule l'exponentielle de `y`.

Écrire des commandes Python utilisant `rd.exponential` et permettant de simuler X .

Partie 3 : estimation d'un paramètre

On suppose dans la suite que le paramètre θ est inconnu et on souhaite en trouver une estimation ponctuelle puis par intervalle de confiance.

On considère pour cela $n \geq 1$ variables aléatoires $Y_1, \dots, Y_n$ toutes définies sur le même espace probabilisé, mutuellement indépendantes, et suivant toutes la même loi que Y .

Pour les questions suivantes, un estimateur de θ est une variable aléatoire calculable à partir de l'échantillon par une formule ne faisant pas intervenir le paramètre inconnu, et destinée à en fournir une estimation. Son biais est $E(T_n) - \theta$; il est sans biais si cette quantité est nulle. Son risque quadratique est $E((T_n - \theta)^2)$. On dit ici que (T_n) est un estimateur convergent de θ si, pour tout $\varepsilon > 0$, $P(|T_n - \theta| \geq \varepsilon)$ tend vers 0.

- 8) On pose

$$T_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k.$$

- 8) a) Justifier que T_n est un estimateur de θ .
- 8) b) T_n est-il un estimateur sans biais de θ ?
- 8) c) Calculer le risque quadratique de T_n en tant qu'estimateur de θ . T_n est-il un estimateur convergent de θ ?
- 9) a) Écrire l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour la variable T_n .

9) b) Établir l'inégalité

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P(\theta \in [T_n - \varepsilon, T_n + \varepsilon]) \geq 1 - \frac{\theta^2}{n\varepsilon^2}.$$

9) c) En utilisant le fait que $\theta \leq \frac{1}{2}$, déterminer un intervalle de confiance pour θ au niveau de confiance 90% lorsque l'on choisit $n = 1000$.