



PRÉPASIMPLE

prepasimple.fr

EDHEC

Mathématiques — Option économique

2021

Mathématiques appliquées

Mathématiques appliquées — Prépa ECG

Annales de concours · Sujet

Exercice 1

Soit f la fonction de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy.$$

Le domaine $\mathbb{R}^2$ est un ouvert.

Partie 1

1. Justifier que f est une fonction de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.
2. a) Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f .

b) Déterminer les points critiques de f .
3. a) Calculer les dérivées partielles d'ordre 2 de f .

b) Calculer la matrice hessienne en chaque point critique et étudier les signes de ses valeurs propres. Vérifier que f ne présente un extremum local qu'en un seul de ses points critiques et préciser sa nature et sa valeur.
4. Cet extremum est-il global ?

Partie 2

On note g la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad g(x) = f(x, 1).$$

5. Montrer que, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 4, l'équation $g(x) = n$, d'inconnue x , possède une unique solution que l'on notera u_n .
6. On note h la restriction de g à $[1, +\infty[$.
 - a) Dresser le tableau de variation de h^{-1} .
 - b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.
 - c) En déduire, en revenant à la définition de u_n , le réel α pour lequel on a $u_n \sim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha$.

Exercice 2

Toutes les variables aléatoires rencontrées dans cet exercice sont supposées définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ que l'on ne cherchera pas à déterminer.

1. a) Vérifier que la fonction f qui à tout réel x associe

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} \exp\left(-\frac{1}{x^2}\right) & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

peut être considérée comme une densité d'une certaine variable aléatoire Y . Pour le calcul de son intégrale sur $]0, +\infty[$, on commencera par intégrer sur $[\varepsilon, R]$, avec $0 < \varepsilon < R$, en utilisant la dérivée de $x \mapsto \exp(-1/x^2)$, puis on fera tendre ε vers 0 et R vers $+\infty$.

- b) On note F la fonction de répartition de Y . Déterminer $F(x)$ selon que $x > 0$ ou $x \leq 0$.

2. a) Vérifier que la fonction g qui à tout réel x associe

$$g(x) = \begin{cases} \frac{2}{x^3} & \text{si } x \geq 1, \\ 0 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

peut être considérée comme une densité d'une certaine variable aléatoire X .

b) On note G la fonction de répartition de X . Déterminer $G(x)$ selon que $x \geq 1$ ou $x < 1$.

3. On considère une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires mutuellement indépendantes, et suivant toutes la même loi que X .

Pour tout entier naturel n non nul, on pose $M_n = \max(X_1, \dots, X_n)$ et on admet que M_n est une variable aléatoire à densité, définie elle aussi sur l'espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

a) On note G_n la fonction de répartition de M_n . Exprimer $G_n(x)$ à l'aide de la fonction G puis en déduire explicitement $G_n(x)$ en fonction de x .

b) On pose $Y_n = \frac{M_n}{\sqrt{n}}$. Justifier que la fonction de répartition F_n de Y_n est donnée par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_n(x) = \begin{cases} \left(1 - \frac{1}{nx^2}\right)^n & \text{si } x \geq \frac{1}{\sqrt{n}}, \\ 0 & \text{si } x < \frac{1}{\sqrt{n}}. \end{cases}$$

4. Déterminer, pour tout réel x négatif ou nul, la limite de $F_n(x)$ lorsque n tend vers $+\infty$.

5. a) Soit x un réel strictement positif. Vérifier que, dès que n est supérieur strictement à la partie entière de $\frac{1}{x^2}$, on a :

$$F_n(x) = \left(1 - \frac{1}{nx^2}\right)^n.$$

- b) Donner un équivalent de $\ln(1 + u)$ lorsque u est au voisinage de 0, puis en déduire, pour tout réel x strictement positif, la limite de $F_n(x)$ lorsque n tend vers $+\infty$.
6. Conclure que la suite $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge en loi vers une variable aléatoire dont la loi est celle de Y .

Exercice 3

On considère un nombre réel a élément de $]0, 1[$ et l'endomorphisme f_a de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$M_a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1-a & a & 0 \\ 0 & 1-a & a \end{pmatrix}.$$

1. a) Donner les valeurs propres de M_a .
- b) Déterminer les sous-espaces propres associés à ces valeurs propres.
- c) En déduire que M_a n'est pas diagonalisable.

2. On pose $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et on note E l'espace vectoriel engendré par I , M_a et M_a^2 .

- a) Quelle est la dimension de E ?
- b) On pose

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer JK^2 puis en déduire $(M_a - I)(M_a - aI)^2$.

c) En déduire que M_a^3 appartient à E .

3. a) Montrer que, pour tout entier naturel n , il existe un unique triplet de réels (u_n, v_n, w_n) tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad M_a^n = u_n M_a^2 + v_n M_a + w_n I.$$

On donnera les valeurs de u_0 , v_0 et w_0 et on écrira les relations liant u_{n+1} , v_{n+1} et w_{n+1} à u_n , v_n et w_n .

b) En utilisant les relations précédentes, expliquer pourquoi le script Python qui suit ne permet pas de calculer et d'afficher les valeurs u_n , v_n et w_n lorsque n et a sont entrés par l'utilisateur. On pourra examiner attentivement la boucle `for`. Les conversions `int` et `float` transforment la saisie en entier et en réel.

Python

```
n = int(input('entrez une valeur pour n : '))
a = float(input('entrez une valeur pour a : '))

u = 0
v = 0
w = 1

for k in range(1, n + 1):
    u = (2*a + 1)*u + v
    v = -a*(a + 2)*u + w
```

```
w = a*a*u
print(u, v, w)
```

c) Modifier la boucle de ce script en conséquence.

4. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+3} = (2a+1)u_{n+2} - a(a+2)u_{n+1} + a^2u_n.$$

On admet que l'on peut en déduire u_n , pour tout entier naturel n , sous la forme :

$$u_n = \frac{(n-1)a^n - na^{n-1} + 1}{(a-1)^2}.$$

5. On dit qu'une suite de matrices $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers la matrice A lorsque n tend vers $+\infty$ si chaque coefficient de A_n tend vers le coefficient situé à la même place dans A .

Il en résulte, et on admet ce résultat, que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} M_a^n = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \right) M_a^2 + \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n \right) M_a + \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n \right) I,$$

lorsque les trois limites de coefficients existent.

a) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n$.

b) En déduire la limite L_a , lorsque n tend vers $+\infty$, de la suite $(M_a^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

c) Vérifier que $L_a^2 = L_a$.

6. On note φ_a l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est L_a . Montrer que :

a) $\forall x \in \text{Ker}(f_a - \text{Id}), \quad \varphi_a(x) = x.$

b) $\forall x \in \text{Im}(f_a - \text{Id}), \quad \varphi_a(x) = 0.$

Problème

On dispose de deux pièces identiques donnant pile avec la probabilité p , élément de $]0, 1[$, et face avec la probabilité $q = 1 - p$.

Partie 1 : un jeu naïf

Deux joueurs A et B s'affrontent lors de lancers de ces pièces de la façon suivante, les lancers de chaque pièce étant supposés indépendants, de même que ceux des deux pièces entre eux et ceux des différentes manches.

Pour la première manche, A et B lancent chacun leur pièce simultanément jusqu'à ce qu'ils obtiennent pile, le gagnant du jeu étant celui qui a obtenu pile le premier. En cas d'égalité et en cas d'égalité seulement, les joueurs participent à une deuxième manche dans les mêmes conditions et avec la même règle, et ainsi de suite jusqu'à la victoire de l'un d'entre eux.

Pour tout k de $\mathbb{N}^*$, on note X_k (respectivement Y_k) la variable aléatoire égale au rang d'obtention du premier pile par A (respectivement B) lors de la k -ième manche. On peut préparer les suites de lancers de toutes les manches, même de celles qui ne seront pas jouées.

On note, toujours pour k dans $\mathbb{N}^*$, E_k l'événement : « Il y a égalité à la fin de la k -ième manche ».

On note E l'événement : « Il y a perpétuellement égalité ».

On note G (respectivement H) l'événement : « A (respectivement B) gagne à ce jeu », et pour tout entier naturel n non nul, on note G_n (respectivement H_n) l'événement : « A (respectivement B) gagne le jeu à la n -ième manche ».

1. Étude de la première manche.

- a) Donner la loi commune à X_1 et Y_1 . En déduire qu'il est quasi impossible que la première manche dure éternellement. On admet alors qu'il en est de même pour chaque manche jouée.
- b) Écrire l'événement E_1 à l'aide des variables X_1 et Y_1 .
- c) Montrer que

$$P(E_1) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(X_1 = i)P(Y_1 = i)$$

et en déduire l'expression explicite de $P(E_1)$ en fonction de p et q .

- d) Justifier sans aucun calcul que les événements G_1 et H_1 sont équiprobables. En déduire la probabilité de G_1 en fonction de p et q .

2. Calcul de la probabilité de l'événement G .

- a) Écrire, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, l'événement G_n à l'aide des événements E_k et de l'événement $[X_n < Y_n]$.
- b) Pour tout entier k supérieur ou égal à 2, calculer $P_{E_1 \cap \dots \cap E_{k-1}}(E_k)$ puis en déduire :

$$\forall n \geq 2, \quad P(G_n) = \left(\frac{p}{1+q} \right)^{n-1} \frac{q}{1+q}.$$

- c) Vérifier que le résultat précédent reste valable pour $n = 1$.
- d) Exprimer G en fonction des G_n puis conclure, après calcul, que $P(G) = \frac{1}{2}$.

- e) Expliquer comment obtenir la probabilité de l'événement H : « B gagne à ce jeu » et en déduire que ce jeu a presque sûrement une fin, c'est-à-dire que $P(E) = 0$.

Partie 2 : un autre jeu

En parallèle du jeu précédent, A parie sur le fait que la manche gagnée par le vainqueur le sera par un lancer d'écart et B parie le contraire.

3. a) À l'aide du système complet d'événements $([X_1 = i])_{i \in \mathbb{N}^*}$, montrer que
- $$P(Y_1 = X_1 + 1) = \frac{pq}{1 + q}.$$
- b) En déduire la probabilité que l'un des deux joueurs gagne à la première manche par un lancer d'écart.
4. a) Utiliser les événements E_k pour écrire l'événement K_n : « L'un des deux joueurs gagne à la n -ième manche par un lancer d'écart », ceci pour tout n de $\mathbb{N}^*$.
- b) En déduire, pour tout entier naturel n non nul, la valeur de $P(K_n)$.
5. Donner finalement la probabilité de l'événement K : « A gagne ce pari ».

Partie 3 : informatique

La commande `rd.geometric(p)`, après `import numpy.random as rd`, simule une variable aléatoire suivant la loi géométrique de paramètre p sur les entiers positifs. Des appels successifs correspondent à des tirages indépendants.

6. Compléter le script Python suivant pour qu'il simule l'expérience décrite dans la partie 1 et affiche le nom du vainqueur du premier jeu ainsi que le numéro de la manche à laquelle il a gagné.

Python

```
import numpy.random as rd

p = float(input('entrez une valeur pour p : '))
c = 1
X = rd.geometric(p)
Y = rd.geometric(p)
while X == Y:
    X = ...
    Y = ...
    c = ...
if X < Y:
    ...
else:
    ...
print(c)
```

7. Compléter la commande suivante afin qu'une fois ajoutée au script précédent elle permette de simuler le deuxième jeu et d'en donner le nom du vainqueur.

Python

```
if ...:
    print('A gagne le deuxième jeu')
else:
    ...
```