



PRÉPASIMPLE

prepasimple.fr

ESSEC

Mathématiques 2 — Option économique

2013

Mathématiques appliquées

Mathématiques appliquées — Prépa ECG

Annales de concours · Sujet

L'objet du problème est l'étude de la concentration en un type de bactéries d'un bassin destiné à la baignade. Une municipalité doit effectuer un prélèvement et l'analyser afin de décider d'autoriser ou non l'utilisation du bassin.

Dans une première partie, on étudiera des propriétés reliant la loi binomiale et la loi de Poisson. Dans une deuxième partie, on regardera la modélisation de la concentration en bactéries du bassin. Enfin, la troisième partie étudiera le principe d'un test destiné à prendre une décision d'utilisation.

Les trois parties peuvent être traitées indépendamment en admettant les résultats des précédentes.

Toutes les variables aléatoires sont définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Si elles existent, on note $E(T)$ et $V(T)$ l'espérance et la variance d'une variable aléatoire T .

I — Lien entre loi binomiale et loi de Poisson

- 1) Pour tout entier n strictement positif, on se donne un réel p_n strictement positif et n variables aléatoires $(X_k)_{1 \leq k \leq n}$ indépendantes et suivant une loi de Bernoulli de paramètre p_n . On suppose que np_n a une limite finie strictement positive et on pose
- $$\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda.$$

1)(a) Quelle est la loi de

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k$$

?

1)(b) Soit k un entier naturel.

1)(b)(i) Donner l'expression de $P(S_n = k)$ pour n supérieur ou égal à k .

1)(b)(ii) Que peut-on dire de la limite de p_n quand n tend vers l'infini ? Étudier la limite de $(1 - p_n)^n$ quand n tend vers l'infini.

1)(b)(iii) Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(S_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

1)(c) On pose $N_n = \max(X_1, \dots, X_n)$.

1)(c)(i) Quelles sont les valeurs que peut prendre la variable aléatoire N_n ?

1)(c)(ii) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(N_n = 0)$.

1)(c)(iii) En déduire la limite en loi de la suite (N_n) .

2) Soit λ un réel strictement positif et n un entier strictement positif tel que $0 < \lambda \leq n$.

On considère U une variable aléatoire de loi de Bernoulli de paramètre λ/n . On a donc $P(U = 1) = \lambda/n$, $P(U = 0) = 1 - \lambda/n$ et, pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2, $P(U = i) = 0$.

2)(a) Montrer que pour tout réel positif u , $1 - u \leq e^{-u}$.

2)(b) Montrer que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left| P(U = k) - \left(\frac{\lambda}{n} \right)^k \frac{1}{k!} e^{-\lambda/n} \right| = \frac{2\lambda}{n} (1 - e^{-\lambda/n}).$$

2)(c) En déduire que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left| P(U = k) - \left(\frac{\lambda}{n} \right)^k \frac{1}{k!} e^{-\lambda/n} \right| \leq 2 \left(\frac{\lambda}{n} \right)^2.$$

3) Soit λ un réel strictement positif et n un entier strictement positif tel que $0 < \lambda \leq n$.

Soient Z, U, V trois variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbb{N}$. On suppose que U suit une loi de Bernoulli de paramètre λ/n et que V suit une loi de Poisson de paramètre λ/n . On observe en particulier que, pour tout entier p strictement négatif,

$$P(Z = p) = P(U = p) = P(V = p) = 0.$$

3)(a) Soit i un entier naturel fixé. En remarquant que pour tous réels a et b , on a

$$|a - b| \leq |a| + |b|, \text{ montrer que la série de terme général } |P(U = k - i) - P(V = k - i)|,$$

où k décrit $\mathbb{N}$, est convergente.

On note sa somme

$$A_i = \sum_{k=0}^{+\infty} |P(U = k - i) - P(V = k - i)|.$$

Montrer que pour tout i , $A_i \leq 2(\lambda/n)^2$.

3)(b) Montrer que la série de terme général $A_i P(Z = i)$ est convergente.

3)(c) Soit k un entier naturel fixé. Montrer que la série de terme général $|P(U = k - i) - P(V = k - i)| P(Z = i)$, où i décrit $\mathbb{N}$, est convergente.

3)(d) On pose

$$B_k = \sum_{i=0}^{+\infty} |P(U = k - i) - P(V = k - i)| P(Z = i).$$

3)(d)(i) Montrer que pour $k \geq 2$, on a

$$\begin{aligned} B_k &= \left| 1 - \frac{\lambda}{n} - e^{-\lambda/n} \right| P(Z = k) + \left| \frac{\lambda}{n} - \frac{\lambda}{n} e^{-\lambda/n} \right| P(Z = k - 1) \\ &+ \sum_{i=0}^{k-2} P(V = k - i) P(Z = i). \end{aligned}$$

3)(d)(ii) Justifier que pour $k \geq 2$, on a

$$\sum_{i=0}^{k-2} P(V = k - i) P(Z = i) \leq P(V + Z = k).$$

3)(d)(iii) Montrer finalement que la série de terme général B_k , où k décrit $\mathbb{N}$, est convergente.

On admettra alors qu'on a

$$\sum_{k=0}^{+\infty} B_k = \sum_{i=0}^{+\infty} A_i P(Z = i),$$

c'est-à-dire

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{i=0}^{+\infty} |P(U = k - i) - P(V = k - i)| P(Z = i) \right) \\ &= \sum_{i=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |P(U = k - i) - P(V = k - i)| \right) P(Z = i). \end{aligned}$$

4) On conserve dans cette question les notations et les hypothèses de la question 3 concernant les variables aléatoires Z, U, V .

4)(a) Montrer que la série de terme général $|P(Z + U = k) - P(Z + V = k)|$ est convergente.

4)(b) Dédurre de la question 3 que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |P(Z + U = k) - P(Z + V = k)| \leq \sum_{i=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{+\infty} |P(U = k - i) - P(V = k - i)| P(Z = i),$$

puis que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |P(Z + U = k) - P(Z + V = k)| \leq 2 \left(\frac{\lambda}{n} \right)^2.$$

5) Soient $U_1, \dots, U_n, V_1, \dots, V_n$, $2n$ variables aléatoires indépendantes telles que, pour tout entier i tel que $1 \leq i \leq n$, U_i suit une loi de Bernoulli de paramètre λ/n et V_i suit une loi de Poisson de paramètre λ/n , avec $0 < \lambda \leq n$.

5)(a) Montrer que pour tout entier naturel k , on a

$$\begin{aligned} & |P(U_1 + \dots + U_n = k) - P(V_1 + \dots + V_n = k)| \\ & \leq \left| P(U_1 + \dots + U_n = k) \right. \\ & \quad \left. - P(U_1 + \dots + U_{n-1} + V_n = k) \right| \\ & \quad + \left| P(U_1 + \dots + U_{n-1} + V_n = k) \right. \\ & \quad \left. - P(U_1 + \dots + U_{n-2} + V_{n-1} + V_n = k) \right| \\ & \quad + \dots + \left| P(U_1 + V_2 + \dots + V_n = k) \right. \\ & \quad \left. - P(V_1 + \dots + V_n = k) \right|. \end{aligned}$$

5)(b) En déduire que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} |P(U_1 + \dots + U_n = k) - P(V_1 + \dots + V_n = k)| \leq \frac{2\lambda^2}{n}.$$

5)(c) Soit X une variable aléatoire de loi binomiale de paramètres n et λ/n . Conclure de ce qui précède que

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left| P(X = k) - e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \right| \leq \frac{2\lambda^2}{n}.$$

II — Modélisation de la concentration en bactéries

Le bassin qu'on étudie est supposé de volume V , en mètres cubes, et on effectue un prélèvement de volume ΔV , en mètres cubes, avec $0 < \Delta V \leq V$. Dans cette situation, la probabilité pour qu'une bactérie spécifique du bassin se trouve dans le prélèvement est égale à $\Delta V/V$.

Supposons que le bassin contienne n bactéries numérotées de 1 à n , avec $n \in \mathbb{N}^*$. On considère alors n variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ à valeurs 0 ou 1 telles que $X_i = 1$ si la

bactérie i se trouve dans le prélèvement et 0 sinon. Les variables en question sont supposées indépendantes.

On pose $c = n/V$, qui représente la concentration en bactéries du bassin par mètre cube.

6)(a) Quelle est la loi de X_i pour $1 \leq i \leq n$?

6)(b) Soit N le nombre de bactéries présentes dans le prélèvement. Montrer que N suit une loi binomiale de paramètres n et $\Delta V/V$.

7) Soit U une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. On appelle F sa fonction de répartition.

Écrire en Python une fonction d'en-tête `def poisson(x, lam):` qui a pour résultat $F(x)$. On s'attachera à minimiser le nombre d'opérations.

On pourra utiliser `np.exp(t)`, qui renvoie e^t , `np.log(t)`, qui renvoie $\ln(t)$ pour $t > 0$, et `np.floor(x)`, qui renvoie la partie entière de x , après `import numpy as np`. La commande `int(y)` transforme une valeur entière représentée sous forme réelle en entier Python.

8) Soit U une variable aléatoire de loi de Poisson de paramètre $c\Delta V$. Soit $K \in \mathbb{N}^*$ fixé.

8)(a) Montrer que

$$|P(N \leq K) - P(U \leq K)| \leq \frac{2c(\Delta V)^2}{V}.$$

8)(b) On suppose $V = 1000 \text{ m}^3$ et que le prélèvement est de volume ΔV égal à un litre, soit 10^{-3} m^3 . Trouver un majorant de l'erreur commise en approximant $P(N \leq K)$ par $P(U \leq K)$.

8)(c) On suppose que la concentration dans le bassin reste inférieure à 10^6 bactéries par mètre cube, et que le prélèvement réalisé est encore de un litre. Quelle est la valeur minimale du volume V garantissant que l'erreur commise dans l'approximation précédente soit inférieure à 10^{-6} ?

On admettra que le résultat de la question 5)(c) peut être amélioré de la façon suivante :

pour X de loi binomiale de paramètres n et λ/n , avec $0 < \lambda \leq n$,

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left| P(X = k) - e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \right| \leq \frac{2\lambda \min(\lambda, 2)}{n}.$$

8)(d) Montrer que si U suit une loi de Poisson de paramètre $c\Delta V$,

$$|P(N \leq K) - P(U \leq K)| \leq 4 \frac{\Delta V}{V}.$$

8)(e) On suppose toujours que le prélèvement réalisé est de un litre. À l'aide de l'inégalité précédente, trouver la valeur minimale du volume V garantissant que l'erreur commise dans l'approximation précédente soit inférieure à 10^{-6} .

III — Construction d'une procédure de test

Un prélèvement est réalisé et mis en culture pendant 24 heures. Les bactéries se multiplient et on obtient ainsi une concentration plus importante et plus facile à estimer. On conserve les notations de la partie précédente et on posera $\lambda = c\Delta V$. En outre, on définit la fonction $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$h(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq -1, \\ (1+x) \ln(1+x) - x & \text{si } x > -1. \end{cases}$$

9) Déterminer les variations de la fonction h sur l'intervalle $] -1, +\infty[$ et préciser le signe de h .

10) En s'inspirant de la démonstration de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, démontrer l'inégalité de Markov : si Y est une variable aléatoire réelle à valeurs discrètes positives admettant une espérance $E(Y)$, pour tout réel α strictement positif, on a

$$P(Y \geq \alpha) \leq \frac{E(Y)}{\alpha}.$$

11) Soit λ un réel strictement positif et soit X une variable aléatoire qui suit une loi de Poisson de paramètre λ . Soit ε un réel strictement positif.

11)(a) Pour tout réel u , calculer $E(e^{uX})$.

11)(b) Trouver un réel strictement positif u_0 tel que $E(e^{u_0(X-(1+\varepsilon)\lambda)}) = e^{-\lambda h(\varepsilon)}$.

11)(c)(i) Montrer que pour tout $u > 0$,

$$P(\lambda^{-1}(X - \lambda) \geq \varepsilon) = P(e^{u(X-\lambda)} \geq e^{\lambda \varepsilon u}).$$

11)(c)(ii) En déduire $P(\lambda^{-1}(X - \lambda) \geq \varepsilon) \leq e^{-\lambda h(\varepsilon)}$.

11)(d) Montrer de même que $P(\lambda^{-1}(X - \lambda) \leq -\varepsilon) \leq e^{-\lambda h(-\varepsilon)}$. On traitera successivement les cas $\varepsilon \geq 1$ et $0 < \varepsilon < 1$.

12) Si la concentration en bactéries est trop élevée, on doit interdire le bassin. La limite maximale de tolérance est fixée à 2000 bactéries par litre. On garde les notations de la question 11 et on suppose de nouveau que $\Delta V = 10^{-3} \text{ m}^3$. Fixons un réel α compris entre 0 et 2000.

12)(a) Montrer que pour tout réel λ strictement supérieur à 2000,

$$P(X \leq \alpha) = P(\lambda^{-1}(X - \lambda) \leq \lambda^{-1}(\alpha - \lambda)) \leq e^{-\lambda h(\lambda^{-1}\alpha - 1)}.$$

12)(b) En déduire que si λ est un réel strictement supérieur à 2000,

$$P(X \leq \alpha) \leq e^{-2000h(\alpha/2000 - 1)}.$$

12)(c) Montrer que l'équation d'inconnue x

$$2000h(x/2000 - 1) = \ln(100)$$

admet une unique solution α_0 comprise entre 0 et 2000.

12)(d) On admettra que $1865 < \alpha_0$. Déduire que si $\lambda > 2000$, $P(X \leq 1865) \leq 1/100$.

12)(e) Exemple d'application : on compte 1600 bactéries dans le prélèvement de un litre.
Que peut-on dire du risque que l'on prend en autorisant le bassin ?