



PRÉPASIMPLE

prepasimple.fr

HEC — 2003

Sujet de mathématiques approfondies

Mathématiques approfondies — Prépa ECG

Annales de concours · Sujet

Toutes les variables aléatoires qui interviennent dans ce problème sont définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ et à valeurs réelles.

L'espérance d'une variable aléatoire X est notée $E(X)$. Si A est un événement de probabilité non nulle on note $P(E/A)$ la probabilité conditionnelle sachant A de l'événement E .

Si n est un entier naturel non nul et si $x_1, \dots, x_n$ sont n réels on note $\min(x_1, \dots, x_n)$ ou $\min_{1 \leq i \leq n} x_i$ le plus petit d'entre eux.

On rappelle que deux variables aléatoires X et Y prenant des valeurs positives ou nulles sont indépendantes si et seulement si, pour tout couple (a, b) de réels positifs ou nuls, on a :

$$P([X \leq a] \cap [Y \leq b]) = P([X \leq a]) P([Y \leq b])$$

On rappelle qu'une variable aléatoire X prenant des valeurs positives ou nulles suit une loi exponentielle si et seulement si elle vérifie la propriété, dite d'absence de mémoire :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}_+^2 \quad P([X > x + y] | [X > x]) = P([X > y])$$

L'objet du problème est l'obtention de diverses caractérisations de la loi exponentielle.

Partie I : Un résultat d'analyse

On considère une fonction réelle φ continue sur $[0, 1]$. On note M le maximum de la fonction $|\varphi|$ sur $[0, 1]$.

Pour tout entier naturel n non nul et tout réel v de $[0, 1]$, on note $Y_{n,v}$ une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et v .

- 1) Soit n un entier naturel non nul, x un réel de $]0, 1[$, ε un réel strictement positif vérifiant les inégalités :

$$0 < x - \varepsilon < x < x + \varepsilon < 1$$

- a) Comparer, pour tout réel v de $[x + \varepsilon, 1]$, les événements $[Y_{n,v} \leq nx]$ et $[|Y_{n,v} - nv| \geq n(v - x)]$ et en déduire les inégalités :

$$P([Y_{n,v} \leq nx]) \leq \frac{v(1-v)}{n\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}$$

- b) Justifier d'une façon analogue, pour tout réel v de $[0, x - \varepsilon]$, l'inégalité :

$$P([Y_{n,v} > nx]) \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2}$$

- c) Établir les inégalités :

$$\left| \int_{x+\varepsilon}^1 \varphi(v) P([Y_{n,v} \leq nx]) dv \right| \leq \frac{M(1-x)}{4n\varepsilon^2} \text{ et } \left| \int_0^{x-\varepsilon} \varphi(v)(1 - P([Y_{n,v} \leq nx])) dv \right| \leq \frac{Mx}{4n\varepsilon^2}$$

- d) En déduire l'inégalité :

$$\left| \int_0^x \varphi(v) dv - \int_0^1 \varphi(v) P([Y_{n,v} \leq nx]) dv \right| \leq \left(\frac{1}{4n\varepsilon^2} + 2\varepsilon \right) M$$

- 2) Établir que, pour tout réel x de $]0, 1[$, on a, pour tout entier naturel n assez grand, l'inégalité :

$$\left| \int_0^x \varphi(v) dv - \int_0^1 \varphi(v) P([Y_{n,v} \leq nx]) dv \right| \leq \frac{9M}{4\sqrt[3]{n}}$$

- 3) On suppose maintenant que la fonction φ vérifie, pour tout entier naturel n :

$$\int_0^1 \varphi(v) v^n dv = 0$$

a) Justifier, pour tout polynôme Q à coefficients réels, l'égalité : $\int_0^1 \varphi(v) Q(v) dv = 0$.

b) Dédire des questions précédentes que, pour tout réel x de $]0, 1[$, on a l'égalité :

$$\int_0^x \varphi(v) dv = 0$$

c) Montrer que la fonction φ est nulle.

Ainsi, on a montré dans cette partie que si φ est une fonction continue sur $[0, 1]$ vérifiant pour tout entier naturel n , $\int_0^1 \varphi(v) v^n dv = 0$, alors φ est nulle.

Dans toute la suite du problème, on considère une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de variables aléatoires indépendantes, positives ou nulles, admettant toutes la même densité (nulle sur l'intervalle $] - \infty, 0[$) dont on note f la restriction à l'intervalle $[0, +\infty[$. On suppose que la fonction f est continue et strictement positive sur $[0, +\infty[$.

On note F la restriction à l'intervalle $[0, +\infty[$ de la fonction de répartition commune à toutes ces variables.

On suppose de plus que X_1 (et donc chaque variable X_i) admet une espérance.

Partie II : Caractérisations de la loi exponentielle à l'aide du minimum d'un n -échantillon

Pour tout entier naturel n non nul, on note I_n l'application définie, pour tout ω de Ω , par $I_n(\omega) = \min_{1 \leq i \leq n} X_i(\omega)$ et on admet que I_n est une variable aléatoire qui admet une espérance.

- 1) Déterminer à l'aide de F , pour tout entier naturel n non nul, la fonction de répartition de I_n .
- 2) Dans cette question, on suppose que la loi de X_1 (qui est la loi commune à tous les X_i) est exponentielle de paramètre λ strictement positif.

- a) Montrer que pour tout entier naturel n non nul, la variable nI_n a même loi que X_1 .
- b) Déterminer, pour tout entier naturel n non nul, l'espérance de I_n .

L'objet des questions suivantes est d'établir que chacune de ces propriétés est caractéristique de la loi exponentielle.

- 3) Dans cette question, on suppose que, pour tout entier naturel n non nul, nI_n a même loi que X_1 .
- a) Établir, pour tout entier naturel n non nul et tout réel x positif ou nul, l'égalité :

$$F(x) = 1 - \left(1 - F\left(\frac{x}{n}\right)\right)^n$$

- b) Déterminer, pour tout réel x positif ou nul, la valeur de : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln \left(1 - F\left(\frac{x}{n}\right)\right)$.
- c) Montrer que la loi de X_1 est exponentielle de paramètre $F'(0)$.
- 4) On revient au cas général.
- a) Montrer que la fonction F réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $[0, 1[$. On note F^{-1} sa réciproque.
- b) À l'aide du changement de variable $u = F(x)$, établir, pour tout entier naturel n non nul, l'égalité :

$$E(I_n) = n \int_0^1 F^{-1}(u)(1-u)^{n-1} du$$

c) Établir, pour tout réel u de $[0, 1[$, les inégalités :

$$0 \leq (1-u)F^{-1}(u) \leq \int_u^1 F^{-1}(t) dt$$

En déduire que la fonction G définie sur $[0, 1]$ par $G(u) = (1-u)F^{-1}(u)$ si u est élément de $[0, 1[$ et par $G(1) = 0$ est continue.

Établir, pour tout entier n au moins égal à 2, les égalités :

$$E(I_n) = n \int_0^1 G(u)(1-u)^{n-2} du \text{ et } E(I_n) = n \int_0^1 G(1-v) v^{n-2} dv$$

d) On suppose maintenant qu'il existe un réel λ strictement positif tel que, pour tout entier naturel n non nul, l'espérance de I_n est égale à $\frac{1}{n\lambda}$.

On note F_λ la restriction à $[0, +\infty[$ de la fonction de répartition de la loi exponentielle de paramètre λ et G_λ la fonction définie sur $[0, 1]$ par $G_\lambda(u) = (1-u)F_\lambda^{-1}(u)$ si u est élément de $[0, 1[$ et par $G_\lambda(1) = 0$.

i) Quelle est, pour n entier naturel au moins égal à 2, la valeur de :

$$n \int_0^1 G_\lambda(1-v) v^{n-2} dv ?$$

ii) À l'aide du résultat de la partie I, montrer que G et G_λ sont égales.

iii) En déduire que la loi de X_1 est exponentielle de paramètre λ .

Partie III : Caractérisation de la loi exponentielle à l'aide des deux premiers records

On pose $R_1 = X_1$. On note R_2 l'application définie, pour tout élément ω de Ω , par :

$R_2(\omega) = X_n(\omega)$ si n est le plus petit des entiers k tels que $X_k(\omega) > X_1(\omega)$;

$R_2(\omega) = X_1(\omega)$ si un tel entier n'existe pas.

On admet que R_2 est une variable aléatoire.

A. Préliminaire

- 1) Exprimer l'événement $[R_2 = R_1]$ à l'aide de la suite d'événements $([X_k \leq X_1])_{k \in \mathbb{N}^*}$.
- 2) Établir, pour tout réel t positif ou nul et pour tout entier naturel n non nul, l'inégalité :

$$P \left(\bigcap_{k=2}^{n+1} [X_k \leq X_1] \right) \leq (F(t))^{n+1} + 1 - F(t)$$

- 3) Soit ε un réel strictement positif. En choisissant un réel t de façon convenable et à l'aide de l'inégalité précédente, montrer que, pour tout entier n assez grand, on a :

$$P \left(\bigcap_{k=2}^{n+1} [X_k \leq X_1] \right) \leq 2\varepsilon$$

Comment énoncer le résultat obtenu ?

- 4) En déduire que, presque sûrement, $R_2 > R_1$.

B. La caractérisation

Pour tout couple (x, y) de réels positifs ou nuls on pose :

$$\phi(x, y) = P([R_1 \leq x] \cap [R_2 - R_1 > y]).$$

1) Soit (x, y) un couple de réels positifs ou nuls et h un réel strictement positif.

a) Justifier l'égalité :

$$\phi(x+h, y) - \phi(x, y) = \sum_{j=1}^{+\infty} P \left([x < X_1 \leq x+h] \cap \left(\bigcap_{i=2}^j [X_i \leq X_1] \right) \cap [X_{j+1} > y + X_1] \right)$$

b) En déduire les inégalités :

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{1 - F(x)} (1 - F(x+y+h)) &\leq \phi(x+h, y) - \phi(x, y) \\ &\leq \frac{F(x+h) - F(x)}{1 - F(x+h)} (1 - F(x+y)) \end{aligned}$$

2) Calculer, pour tout couple (x, y) de réels positifs ou nuls, la limite de $\frac{\phi(x+h, y) - \phi(x, y)}{h}$ quand h tend vers 0 par valeurs supérieures et, en admettant que le résultat tient encore pour la limite quand h tend vers 0 par valeurs inférieures, en déduire l'égalité :

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(x, y) = \frac{f(x)}{1 - F(x)} (1 - F(x+y))$$

3) Dans cette question on suppose que la loi de X_1 est exponentielle de paramètre λ strictement positif.

a) Établir, pour tout couple (x, y) de réels positifs ou nuls, l'égalité :

$$\phi(x, y) = (1 - e^{-\lambda x})e^{-\lambda y}.$$

b) En déduire la loi de $R_2 - R_1$ puis l'indépendance des variables R_1 et $R_2 - R_1$.

- 4) Réciproquement, dans cette question, on suppose que les variables R_1 et $R_2 - R_1$ sont indépendantes et on note G la fonction de répartition de $R_2 - R_1$.
- a) Établir, pour tout couple (x, y) de réels positifs ou nuls, l'égalité :
- $$\frac{1 - F(x + y)}{1 - F(x)} = 1 - G(y).$$
- b) En déduire que les fonctions G et F sont égales puis, à l'aide de la propriété d'absence de mémoire, montrer que la loi de X_1 est exponentielle.